



Centrum Medyczne Spychalscy Sp.j.
63-000 Środa Wlkp. ul. Strzelecka 33
NIP:7861680460; KRS 0000409921
tel. 694 170 541
strona internetowa: www.klinikapsychalscy.pl

Przygotowanie do gastroskopii

Pacjentka/Pacjent

.....
Imię, nazwisko

PESEL

.....
....

I. Przed zabiegiem

1. 14 dni przed badaniem należy odstawić leki osłaniające błonę śluzową np. Rennie, Alugastrin.
2. 7 dni przed badaniem w porozumieniu z lekarzem prowadzącym zaprzestać lub zmodyfikować przyjmowanie:
 - preparatów żelaza,
 - leków antyagregacyjnych: Aspiryna, Acard, Polopiryna, Aclostin, Ticlo, Plavix itp.
 - przeciwzakrzepowych: Sintrom, Synkumar, Acenocumarol, Warfaryna, Eliquis, Pradaxa, Xarelto – lekarz może zamienić je na heparyny drobnocząsteczkowe np. Clexane, Fraxodi, Fraxiparine, Fragmin, Neoparin.

II. W dniu zabiegu

1. W dniu badania należy być na czczo – **co najmniej 8 godzin przed badaniem nie należy jeść.**
2. 6 godzin przed badaniem nie należy nic pić, palić papierosów ani żuć gumy.
3. Leki zażywane przewlekłe należy przyjąć popijając szklanką wody (250 ml) nie później niż 2 godziny przed zabiegiem.
4. Wyjątek stanowią osoby chorujące na cukrzycę, u których badanie powinno być wykonane w godzinach porannych. W tym przypadku, pacjent przed badaniem nie zażywa leków przeciwcukrzycowych i insuliny.
5. Na badanie należy się zgłosić 15 minut przed wyznaczoną godziną.
6. Przed zabiegiem pacjent wyraża pisemną zgodę na wykonanie zabiegu.

7. Nie należy zakładać golfów, szali, apaszek, biżuterii.
8. Zaleca się zabranie i przedstawienie lekarzowi opisów poprzednio wykonanych badań endoskopowych.

III. Po badaniu

1. Nie należy jeść, pić oraz palić papierosów do momentu ustąpienia znieczulenia gardła (po około 30-60 min).

IV. Badanie w znieczuleniu dożylnym (analgosedacja)

1. Podanie dożylnie środka zapewniającego pacjentowi uczucie komfortu, senności i relaksu.
Pacjent może od czasu do czasu zasypiać, jednak łatwo go wybudzić.
2. Po badaniu można jeść od momentu wskazanego przez anestezjologa.
3. W zależności od decyzji anestezjologa, pacjent po zabiegu przebywa na terenie Centrum od 30 min.
do 2 godz.
4. Pacjent może opuścić Centrum w towarzystwie osoby pełnoletniej.
5. Po badaniu nie powinien prowadzić pojazdów mechanicznych.